

# KALENDARZ SZCZEPIEŃ

Polnisch

Zalecenia Stałej Komisji ds. Szczepień (STIKO), 2012. www.stiko.de

Szczepienia powinny odbywać się możliwie najwcześniej. Kontrola statusu szczepienia ma sens w każdym wieku. Brakujące szczepienia powinny być uzupełnione od razu, zgodnie z zaleceniami dla danego wieku.

ROBERT KOCH INSTITUT



WIEK	niemowlęta (w miesiącach)			małe dzieci		dzieci (w latach)			młodzież		dorośli	
	2	3	4	11 – 14	15 – 23	2 – 4	5 – 6	7 – 8	9 – 11	12 – 17	od 18	od 60
	U4		U6		U7	U7A/8	U9	J1				
<b>Tężec</b>	G1	G2	G3	G4	N	A1	N	A2	A (co 10 lat, N w razie potrzeby)			
<b>Błonica</b>	G1	G2	G3	G4	N	A1	N	A2	A (co 10 lat, N w razie potrzeby)			
<b>Krzusiec</b> Koklusz	G1	G2	G3	G4	N	A1	N	A2	A (N w razie potrzeby) e			
<b>Nagminne porażenie dziecięce</b> Poliomyelitis	G1	G2 <sup>a</sup>	G3	G4	N			A1	N (w razie potrzeby)			
<b>Wirusowe zapalenie wątroby typu B</b>	G1	G2 <sup>a</sup>	G3	G4	N							
<b>Hib</b> Haemophilus influenzae typu b	G1	G2 <sup>a</sup>	G3	G4	N <sup>f</sup>							
<b>Pneumokoki</b>	G1	G2	G3	G4	N <sup>f</sup>						S <sup>b</sup>	
<b>Meningokoki</b> Grupa serologiczna C				G1 (od 12 miesięcy)		N						
<b>Odra świnka różyczka</b>				G1	G2	N			S <sup>c</sup>			
<b>Ospa wietrzna</b> Varicella				G1	G2	N						
<b>Grypa</b> Influenza									S (co roku)			
<b>HPV</b> Wirus brodawczaka ludzkiego									G1 – G3 <sup>d</sup>			

Najbliższe terminy szczepień

---



---



---



---



---

## OBJAŚNIENIA

- G** PODSTAWOWE UODPORNIEŃ (w postaci do 4 szczepionek częściowych G1–G4)
- S** STANDARDOWE SZCZEPIENIE
- A** SZCZEPIENIE PRZYPOMINAJĄCE
- N** SZCZEPIENIE UZUPEŁNIAJĄCE (podstawowe uodpornienie wszystkich jeszcze nieszczepionych lub dokończenie niekompletnej serii szczepień)
- U** Badanie w celu wczesnego rozpoznania
- J** Badanie młodzieży (J1 w wieku od 12 do 14 lat)

- a** W przypadku zastosowania szczepionki monowalentnej można zrezygnować z tej dawki.
- b** Szczepienie jednorazowe, szczepienie przypominające zalecane tylko dla określonych wskazań.
- c** Jednorazowe szczepienie przeciwko odrze dla wszystkich osób urodzonych po roku 1970 ≥ 18 lat z niejasnym statusem szczepienia, bez szczepienia lub z tylko jednym szczepieniem w dzieciństwie. Szczególnie jedną szczepionką przeciwko odrze, śwince i różyczce.
- d** Standardowe szczepienie dla dziewcząt i młodych kobiet.
- e** Jednorazowe szczepienie przypominające, możliwe z następnym szczepieniem przeciwko tężcowi / błonicy / ew. Poliomyelitis.
- f** Ilość koniecznych szczepień zależy od wieku.



Gefördert durch:



aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages